



Az emlőrák különböző stádiumai

Világszerte több mint **1,6 millió** emlőrákos esetet diagnosztizálnak évente és több mint **500 ezren** halnak meg a betegségben



Stádiumok



Korai stádium (I)

A daganat 2 cm-nél nem nagyobb és nem terjedt rá a nyirokcsomókra



Lokálisan előrehaladott (II, III)

A daganat mérete 2 és 5 cm között van, és lehet, hogy már a környéki nyirokcsomókra is ráterjedt (hónaljba vagy a szomszédos emlőállományba)



Előrehaladott vagy metasztatikus (IV)

A daganat áttért a test egyéb szerveire is, pl. a tüdőre, a májra vagy a csontokba. Ezt előrehaladott vagy metasztatikus daganatnak hívják


Diagnózis



A betegek **61%-ánál** az emlőrákot korai stádiumban diagnosztizálják



A betegek **32%-ánál** az emlőrákot a lokálisan előrehaladott stádiumban diagnosztizálják




A betegek **6%-ánál** az emlőrákot az előrehaladott vagy metasztatikus stádiumban diagnosztizálják


A maradék 1% ismeretlen stádiumú

Prognózis és túlélés


Az emlőrák prognózisa annál rosszabb, minél későbbi stádiumban kerül felismerésre, amikor a daganat már tovaterjedhet a szervezetben



A korai emlőrákban szenvedő betegek mintegy **98%-a** él még 5 éven túl




A lokálisan előrehaladott emlőrákban szenvedő betegek körülbelül **85%-a** él még 5 éven túl




Az előrehaladott vagy metasztatikus emlőrákban szenvedő betegek nagyjából **26%-a** él még 5 éven túl


Kezelési lehetőségek




A daganat **sebészi** eltávolítása a kezelés központi eleme, de vannak egyéb kezelési lehetőségek is



Sugárterápia



Kemoterápia



Endokrin terápia



Célzott terápia